

⑬ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

②① Anmeldenummer: 88115267.6

⑥① Int. Cl.⁴: C 12 P 19/10

②② Anmeldetag: 04.11.86

③① Priorität: 05.11.85 DE 3539180

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
20.05.87 Patentblatt 87/21

⑥④ Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE FR GB IT LI NL SE

⑦① Anmelder: Consortium für elektrochemische Industrie
GmbH
Zielstattstrasse 20
D-8000 München 70(DE)

⑦② Erfinder: Böck, August, Prof. Dr.
Lindenstrasse 10
D-8085 Geltendorf(DE)

⑦③ Erfinder: Lechner, Konrad
Turnerstrasse 33
D-8000 München 82(DE)

⑦④ Erfinder: Huber, Otto, Dr.
Breitbrunner Strasse 17
D-8000 München 70(DE)

④④ Aureobasidium-pullulans-Stamm. Herstellungsverfahren und Verwendung.

⑥⑦ Die Erfindung betrifft Aureobasidium-pullulans-Stämme, die Pullulan, aber praktisch kein Melanin produzieren. Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zur Herstellung dieser Stämme und ihre Verwendung.

1

**Aureobasidium-pullulans-Stamm, Herstellungsverfahren und
Verwendung**

Die Erfindung betrifft einen Aureobasidium-pullulans-Stamm,
der Pullulan, aber praktisch kein Melanin produziert, sowie
ein Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung.

Es ist bekannt, daß Stämme der Gattung Aureobasidium Pullulan
produzieren. Pullulan ist ein Polysaccharid mit Maltotriose-
einheiten ($\alpha 1 \rightarrow 4$ -Bindungen), die folgendermaßen verknüpft
sind: $\alpha 1 \rightarrow 6$; vgl. Bernier in Can. J. Microbiol., 4 (1958)
195 - 204 und Bender & Lehmann & Wallenfels in Biochim.
Biophys. Acta, 36 (1959) 309 - 316.

Das Polysaccharid Pullulan findet verschiedene Verwendung,
beispielsweise

- (1) zur Herstellung transparenter Filme, die für Kohlendioxid,
jedoch nicht für Sauerstoff durchlässig sind,
- (2) als Flockungsmittel und
- (3) als Dextranersatz in Infusionsflüssigkeiten.

Stämme der Gattung Aureobasidium bilden während der Kultivierung
ein grün-schwarzes Pigment (Melanin). Dieses Melanin
kann bei der üblichen Extraktion von Pullulan nicht abgetrennt
werden. Es ist daher eine Teilaufgabe der Erfindung,

Aureobasidium-pullulans-Stämme vorzusehen, die gegenüber dem Stand der Technik in vermindertem Umfang Melanin produzieren. Gemäß weiteren Teilaufgaben der Erfindung sollen ein Verfahren zur Herstellung derartiger Stämme sowie die Verwendung dieser Stämme zur Herstellung von Pullulan vorgesehen werden.

Demgemäß betrifft die Erfindung einen Aureobasidium-pullulans-Stamm, der Pullulan, aber eine verminderte Melaninmenge produziert, und der dadurch erhältlich ist, daß man

- (a) einen A.-pullulans-Stamm, der Pullulan und Melanin produziert, in an sich bekannter Weise mutierenden Bedingungen aussetzt,
- (b) danach den Stamm, der den mutierenden Bedingungen ausgesetzt worden ist, in an sich bekannter Weise kultiviert und
- (c) einen mutierten A.-pullulans-Stamm (in Form von einer oder mehreren Kolonien) selektiert,

und davon abgeleitete Stämme, wobei der selektierte Stamm und die abgeleiteten Stämme im Vergleich zum Ausgangsstamm weniger oder nicht pigmentiert sind.

Den mutierten Stamm kann man beispielsweise auf einem Agarplatten-Kulturmedium kultivieren. Die selektierten Kolonien kann man in Flüssigkultur daraufhin prüfen, ob sie noch Pullulan in befriedigender Ausbeute produzieren.

Erfindungsgemäße A.-pullulans-Stämme sind dadurch erhältlich, daß man durch Bestrahlung mit UV-Licht oder chemische Behandlung mutiert, insbesondere durch Behandlung mit Ethylmethansulfonat.

Die Melaninbildung benötigt einige Zeit. Um sich ein Urteil über die Melaninbildung oder die ausbleibende Melaninbildung von Kulturen machen zu können, ist es vorteilhaft, wenn während dieser Zeitspanne die einzelnen Kolonien nicht zu einem Zellrasen zusammenwachsen. Dazu kann man bei der Stufe (b) in einem Temperaturbereich kultivieren, bei dem keine oder eine geringe Zellvermehrung, jedoch noch Melaninbildung stattfindet, insbesondere bei einer Temperatur im Bereich von 2 bis 13 und vorzugsweise 4 bis 10 °C.

Als Ausgangsstamm kann man ATCC 9348 verwenden.

Ein Mutationsprodukt dieses bekannten Stammes ist der A.-pullulans-Stamm P 56, der bei der folgenden Hinterlegungsstelle hinterlegt und die folgende Hinterlegungsnummer erhalten hat: Deutsche Sammlung für Mikroorganismen, DSM 3562. P 56 unterscheidet sich von ATCC 9348 mykologisch dadurch, daß der erfindungsgemäße Stamm kein Melanin bildet und die Pullulanbildung um 50 % und mehr als beim Ausgangsstamm erhöht ist.

Erfindungsgemäße A.-pullulans-Stämme lassen sich dadurch herstellen, daß man die vorstehend genannten Stufen (a) bis (c) gegebenenfalls mit den spezielleren vorstehend genannten Maßnahmen durchführt.

Pullulan kann man dadurch gewinnen, daß man einen erfindungsgemäßen A.-pullulans-Stamm in einem Kulturmedium kultiviert, Pullulan produzieren läßt und das gebildete Pullulan vom Kulturmedium abtrennt. Das Kulturmedium soll Kohlenstoffquellen enthalten, die der Stamm verwerten kann (beispielsweise Glukose, Saccharose, Maltose oder Xylose), sowie Hefeextrakt und anorganische Salze, die für das Zellwachstum wesentlich sind. Üblicherweise kultiviert man unter aeroben Bedingungen als Schüttelkultur oder Submerskultur unter Belüften bei einer Temperatur von beispielsweise 20 bis 30 °C und einem pH-Wert von beispielsweise 2,5 bis 6.

Nachstehend wird die Erfindung durch Beispiele näher erläutert.

Beispiel 1

Man kultiviert einen im Handel erhältlichen A.-pullulans-Stamm (beispielsweise ATCC 9348) in einem Kulturmedium nach Le Duy mit einem Gehalt an: 5 g/l K_2HPO_4 , 1 g/l NaCl, 0,6 g/l $(NH_4)_2SO_4$, 0,2 g/l $MgSO_4$, 0,4 g/l Hefeextrakt und 30 g/l Saccharose, wobei der pH-Wert mit HCl auf 5,5 eingestellt wird.

Der Stamm wird 24 h lang in dem genannten Medium kultiviert. Danach trennt man das Mycel durch Zentrifugieren bei 6000 x g in 5 min ab. Der Überstand wird erneut bei 17000 x g 10 min lang zentrifugiert. Die beim Zentrifugieren angefallenen Pellets wäscht man mit physiologischer Kochsalzlösung, wonach man die Zelldichte auf 1×10^7 Zellen/ml einstellt. Danach bestrahlt man die Suspension mit UV-Licht (354 nm; 1400 $\mu W/cm^2$) 7 bis 8 min lang.

Die Suspension (0,1 ml) platiert man 2 bis 3 d lang auf einer Agar-Kulturplatte (Extrakt von 300 g Kartoffeln, 20 g Glukose und 15 g Agar/l). Die Platten läßt man 8 d lang bei 4 °C stehen. Danach selektiert man unpigmentierte und praktisch unpigmentierte Kolonien. Die selektierten Kolonien überprüft man daraufhin, ob sie noch in befriedigendem Maße Pullulan produzieren.

Beispiel 2

Man stellt ein Kulturmedium mit folgenden Bestandteilen her:
1 l destilliertes Wasser, 5 g K_2HPO_4 , 1 g NaCl, 0,6 g $(NH_4)_2SO_4$, 0,2 g $MgSO_4 \times 7 H_2O$, 0,4 g Hefeextrakt und 30 g Kohlenstoffquellen (vgl. vorstehend).

0222302

100 ml des Kulturmediums werden mit HCl auf einen pH-Wert von 5,5 eingestellt.

Danach gibt man das Kulturmedium in einen 500-ml-Erlenmeyerkolben und sterilisiert. Danach inokuliert man das Kulturmedium mit dem erfindungsgemäßen Stamm P 56, der gemäß Beispiel 1 hergestellt wurde. Man kultiviert bei 26 °C unter Rühren (200 U/min).

Nach 7-tägigem Kultivieren zentrifugiert man die Kultur bei 27000 x g 15 min lang. Zum Überstand gibt man das doppelte Volumen an 96-proz. Ethanol, mischt und zentrifugiert wieder bei 1000 x g 10 min lang, wobei sich weißes Pullulan abtrennt. Das gesammelte Produkt wird gewaschen, gemahlen, wieder in Wasser aufgelöst, erneut mit Ethanol gefällt und danach getrocknet.

Zur Identitätsprüfung kann man das erhaltene Produkt einer ¹³C-NMR-Analyse sowie einer Hochleistungsflüssigchromatographie (HPLC) unterwerfen.

Vergleichsbeispiel 1

Beispiel 2 wird mit der Ausnahme wiederholt, daß man einen A.-pullulans-Stamm des Handels (beispielsweise ATCC 9348) verwendet. Das erhaltene Pullulan besitzt eine intensive grün-schwarze Färbung.

Patentansprüche

1. Aureobasidium-pullulans-Stamm, der Pullulan, aber eine verminderte Melaninmenge produziert, dadurch e r h ä l t l i c h , daß man

(a) einen A.-pullulans-Stamm, der Pullulan und Melanin produziert, in an sich bekannter Weise mutierenden Bedingungen aussetzt,

(b) danach den Stamm, der den mutierenden Bedingungen ausgesetzt worden ist, in an sich bekannter Weise kultiviert und

(c) einen mutierten A.-pullulans-Stamm (in Form von einer oder mehreren Kolonien) selektiert,

und davon abgeleitete Stämme, wobei der selektierte Stamm und die abgeleiteten Stämme im Vergleich zum Ausgangstamm weniger oder nicht pigmentiert sind.

0222302

2. Stamm nach Anspruch 1, dadurch e r h ä l t l i c h , daß man durch Bestrahlung mit UV-Licht oder chemische Behandlung mutiert, insbesondere durch Behandlung mit Ethylmethansulfonat.
3. Stamm nach Anspruch 1 oder 2, dadurch e r h ä l t l i c h , daß man bei der Stufe (b) in einem Temperaturbereich kultiviert, in dem keine oder eine geringe Zellvermehrung, jedoch noch Melaninbildung stattfindet, insbesondere bei einer Temperatur im Bereich 2 bis 13, vorzugsweise 4 bis 10 °C.
4. Stamm nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch e r h ä l t l i c h , daß man als Ausgangsstamm ATCC 9348 verwendet.
5. Aureobasidium-pullulans-Stamm P 56 . und davon abgeleitete Stämme, die Pullulan aber eine gegenüber ATCC 9348 verminderte Melaninmenge produzieren.
6. Verfahren zur Herstellung eines A.-pullulans-Stammes gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch g e k e n n - z e i c h n e t , daß man die Stufen (a) bis (c) gemäß Anspruch 1 durchführt.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch g e k e n n - z e i c h n e t , daß man die Maßnahmen gemäß einem der Ansprüche 2, 3 und 4 durchführt.
8. Verwendung eines A.-pullulans-Stammes gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 zur Herstellung von Pullulan.